

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

藥品名稱： Imidapril 10mg tab
英商品名： TANATRIL* 10mg tab
中文藥名： 田納滋錠
藥品代號： 22492



□藥品作用簡介：(一種藥可能會有許多不同療效,如您的病情治療與以下所述有差異時,請與我們聯絡)

是一種血管收縮素轉化酵素抑制劑，藉由阻斷血管張力素II的生成，而使周邊血管阻力降低，改善高血壓症狀。

□一般用法：(醫師會因各種因素而調整藥品劑量,您藥袋上之用法與以下所示用法將會稍有差異,如有疑問請與我們聯絡)

1. 通常一天服用一次。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

□忘記服藥時該怎麼辦？

想起來的時候，儘快補吃。但若已接近下次服藥時間時，則不要補吃，只服用一次劑量即可，千萬不要服用雙倍的劑量。

□服藥時之注意事項：

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有腎及肝臟等疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
5. 請勿自行將藥拿給別人吃，並慎防兒童取用，以免發生意外。

□儲存方法：

室溫儲存。

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

□飲食方面之注意事項：

如果醫囑低鹽低鈉飲食，請小心遵守。使用含鉀代鹽之前，請告知您的醫師。

□藥品副作用與處置方法：

雖然副作用是不常見，但仍有可能會發生。 1. 如果以下副作用變嚴重或持續存在，請告知您的醫師：噁心、虛弱、頭痛、胃痛、眩暈、情緒不穩定、味覺改變、低血壓、乾咳等。

2. 如果您有以下任何症狀，請立即告知醫師：低血壓、水腫、嚴重的乾咳等。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
