

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

藥品名稱：Olmesartan 40mg tab

英商品名：OLMETEC* 40mg tab

中文藥名：雅脈膜衣錠

藥品代號：22519



□藥品作用簡介：(一種藥可能會有許多不同療效，如您的病情治療與以下所述有差異時，請與我們聯絡)

降血壓劑，含血管加壓素 II-接受體拮抗劑，可單一用藥治療高血壓或和其他高血壓用藥併用。

□一般用法：(醫師會因各種因素而調整藥品劑量，您藥袋上之用法與以下所示用法將會稍有差異，如有疑問請與我們聯絡)

1. 建議一天服用一次膜衣錠，隨餐或空腹服用皆可。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

□忘記服藥時該怎麼辦？

想起來的時候，儘快補吃。但若已接近下次服藥時間時，則不要補吃，只服用一次劑量即可，千萬不要服用雙倍的劑量。

□服藥時之注意事項：

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的高血壓藥物或其它類藥物，特別是鋰鹽、非類固醇抗發炎藥、陽痿藥物(犀利士、樂威壯、威而鋼)、保鉀利尿劑、含鉀用藥、中草藥，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有血液問題、腎功能不全、第二型糖尿病或其他代謝障礙等疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
5. 請勿自行將藥拿給別人吃，以免發生意外。
6. 請儲存於緊密容器，室溫儲存，並慎防兒童取用。

□儲存方法：

室溫儲存。

□飲食方面之注意事項：

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

如果醫囑低鹽低鈉飲食，請小心遵守。使用含鉀代鹽之前，請告知您的醫師。

□藥品副作用與處置方法：

雖然副作用是不常見，但仍有可能會發生。

1. 如果以下副作用變嚴重或持續存在，請告知您的醫師：頭痛、暈眩、全身無力、背痛、腹瀉、血尿、血糖過高、似感冒症狀、紅疹等。
2. 如果您有以下任何症狀，請立即告知醫師：水腫、皮膚紅疹等。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
