

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

藥品名稱：Irbesartan 300mg FC tab

英商品名：APROVEL* 300mg FC tab

中文藥名：安普諾維 膜衣錠

藥品代號：22506



□藥品作用簡介：(一種藥可能會有許多不同療效，如您的病情治療與以下所述有差異時，請與我們聯絡)

可阻斷血液中某些使血管緊縮的物質，因此可用於治療高血壓。

□一般用法：(醫師會因各種因素而調整藥品劑量，您藥袋上之用法與以下所示用法將會稍有差異，如有疑問請與我們聯絡)

1. 通常一天1次。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

□忘記服藥時該怎麼辦？

想起來的時候，儘快補吃。但若已接近下次服藥時間時，則不要補吃，只服用一次劑量即可，千萬不要服用雙倍的劑量。

□服藥時之注意事項：

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是利尿劑、Lithium、鉀補充劑、其他降血壓劑，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有腎、心臟、糖尿病等疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
5. 請勿自行將藥拿給別人吃，以免發生意外。
6. 請儲存於緊密容器，室溫儲存，並慎防兒童取用。

如果您計劃手術，包括牙科手術，請事先告知您的醫師或牙醫，您正服用本藥。

□儲存方法：

室溫儲存

□飲食方面之注意事項：

如果醫囑低鹽低鈉飲食，請小心遵守。使用含鉀代鹽之前，請告知您的醫師。

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

□藥品副作用與處置方法：

雖然副作用是不常見，但仍有可能會發生。

1. 如果以下副作用變嚴重或持續存在，請告知您的醫師：頭痛、眩暈、咳嗽、腹瀉、失眠、肌肉疼痛、發燒、喉嚨痛等。
2. 如果您有以下任何症狀，請立即告知醫師：皮膚發疹、水腫、呼吸困難等。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
