

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

藥品名稱： Furosemide 40mg tab

英商品名： FURIDE* 40mg tab

中文藥名： 舒利諾錠

藥品代號： 23634



□藥品作用簡介：(一種藥可能會有許多不同療效,如您的病情治療與以下所述有差異時,請與我們聯絡)

本藥是利尿劑，可以將體內多餘的水和鹽經尿中排出，通常用於高血壓或其他疾病所造成的水腫，例如心臟疾病等。

□一般用法：(醫師會因各種因素而調整藥品劑量,您藥袋上之用法與以下所示用法將會稍有差異,如有疑問請與我們聯絡)

1. 通常一天吃 1-2 次，要遵從醫師的指示。
2. 服用約 30 分鐘之後開始有效，作用時間約 6-8 小時，所以如果每天服用 1 次，請在早上服用，如果每天服用 2 次，第 2 次服用時，請在傍晚服用，以免影響晚上的睡眠。

□忘記服藥時該怎麼辦？

當想起忘記吃藥時，儘快補吃，但不可以吃兩倍的量去補您忘記的那一次。

□服藥時之注意事項：

1. 定期看醫師，並做血液的檢查。
2. 一定要常量血壓。
3. 即使覺得情況比較好了，也不可自行停藥。
4. 每天量體重並記錄，若體重下降很多，要馬上告知醫師。
5. 出門旅行或國定假日前，要備足本藥的藥量。

□儲存方法：

室溫儲存

□飲食方面之注意事項：

聽從醫生的指示，不吃太鹹，每日要運動，補充鉀，以及吃鉀含量高的食物，如香蕉、柳橙汁。

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

☐藥品副作用與處置方法：

副作用並不常發生，但仍需注意：1. 頻尿，會發生在服藥後八小時。2. 抽筋、肌肉無力，要注意鉀的補充。3. 暈眩、意識模糊、頭痛、多汗或是發燒、聲音沙啞、不正常的出血、瘀青、體重急速下降、皮膚紅疹…等則應立即告知醫師(回診就醫)。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
