

認識腹膜炎(Peritonitis)

一、如何發現腹膜炎及症狀：

於每一次換完藥水後檢查透析液，若引流出的藥水呈混濁樣，通常是腹膜炎的第一個症狀，並會伴隨腹痛、發燒及畏寒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。

二、腹膜炎的處理？

發現藥水混濁時，將第一袋混濁的引流袋管夾夾好，並以清潔塑膠封套套好，立即與腹膜透析護理人員聯繫及攜帶已引流之混濁藥水回腹膜透析中心進行檢驗，並且盡速就醫。

三、腹膜炎如何預防？

- 連接、分離接頭時無菌技術須確實，手一旦觸碰非無菌部位須立即洗手。
- 換液時關門窗、冷氣及電風扇須確實執行。
- 正確洗手及正確戴口罩。
- 換液時光線要充足並保持換液桌面及環境的清潔。
- 執行換液時需集中注意力。
- 確實遵守標準的換液步驟及導管出口處護理。
- 避免接頭鬆脫，正確執行鬆脫後之處理。
- 預防便秘或腹瀉。
- 勿泡三溫暖、泡澡、游泳，以避免感染。
- 當懷疑可能接頭沾污時，必須盡快與腹膜透析人員聯絡，不可再將透析液灌入。
- 當發現身體有任何的不適，須回醫院就診。

透析液清晰能見文字【正常】



藥水混濁【感染】



腹膜炎不會自行痊癒
如果您發現透析液有混濁.發燒或腹痛
~ 請立即電告您的腹膜透析護理人員 ~

 **馬偕紀念醫院台東分院**
Mackay Memorial Hospital Taitung Branch

~ 祝您 ~ 平安健康 ~